

පැපර් පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල

අසාමාන්‍ය නම්:

- ගැබ්ගෙල පිළිකා ස්ථිරවම ඇත්දැයි හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කෙරේ.
- ඒ සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.

සාමාන්‍ය නම්:

- එය සතුටු දායක පණිවිඩයකි.
- ඔබගේ ඊලඟ පැපර් පරීක්ෂණය වසර 5කින් සිදුකර ගත යුතුය.

පැපර් පරීක්ෂණයට යොමු විය හැක්කේ කෙලසකද?

- ඔබ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන සුවනාරී සායනය මගින්.
- රෝහල් මගින් පවත්වන සුවනාරී/නාරිවේද සායන මගින්.
- පෞද්ගලික අංශයේ සායන මගින්.
- පිළිකා කලින් හඳුනා ගැනීමේ ජාතික සායනය මගින්.
නො. 516, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට.
අරකථන අංකය: 011 315 92 27



නිරෝගී කාන්තාවකි,

- ඔබගේ ජීවිතය සතුටින් ගත කරන්න.
- පිරිසිදු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්න.

හමුත් මේ ගැහැන් කැළඹිලිමත් වන්න

ඔබගේ ලිංගික ජීවිතය විශ්වාසවන්ත එක් සහකරුවෙකුට සීමා කරන්න.

එසේ නොවන ලිංගික ඇසුරකදී උපත් පාලන කොපු භාවිතා කරන්න. ආරක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියා පිළිපදින්න.

නිරෝගී සුවිධිර දිවියකට

පැපර් පරීක්ෂණය

ඔබ වෙනුවෙන්මයි

එය,

සුවනාරී සායන මගින්

තොම්ලේ

ඔබ වෙත සැපයෙන

ප්‍රජා සේවාවකි.



ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩ සටහන

555, ඇල්විටිගල මාවත,
නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05
ටෙලි : 011-2368627, 0113159227



E : nccpsl@yahoo.com
W : www.health.gov.lk

Produced by: PPRANKOPPE

**හැබ්ගෙල පිළිකාව
වලක්වා ගෙන
ජීවිතය ජය ගවු**




**නිරෝගී කාන්තාවක් වන්න
ජීවිතය සතුටින් ගත කරන්න**

බව දන්නවාද?

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ට සැදෙන ජිලිකා අතරින්
ඇඩ්ගෙල ජිලිකාව දෙවන ස්ථානය ගන්නා බව !

ඇඩ්ගෙල ජිලිකාවක් පූර්ව ජිලිකා අවධියේදී
පැපර් පරීක්ෂණ වෙතින් හඳුනා ගත හොත් එය
සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කළ හැකි බව !

ඔබගේ පැපර් පරීක්ෂණ කට ගැනීමට
රෝග ලක්ෂණ උපාල වන තුරු නොසිටින්න



ගැබ්ගෙල පිළිකාවක මූලික රෝග ලක්ෂණ මොනවාද?

- සෝනි මාර්ගයෙන් අක්‍රමවත් රුධිර වහනය.
- ලිංගික සංසර්ගයට පසු රුධිර වහනය.
- සෝනි මාර්ගයෙන් අධික දුර්ගන්ධයකින් යුත් ශ්‍රාවයක් පිටවීම.
- මාස් ශුද්ධිය නැවතී ඇති කාන්තාවන්ගේ සෝනි මාර්ගයෙන් රුධිරය පිට වීම.



ගැබ්ගෙල පිළිකාවක අවදානම වැඩි කාටද?

- ❖ HPV (හියුමන් පැපිලෝමා) නමැති වෛරසය ආසාදිත කාන්තාවන්ට.
- ❖ ගැබ්ගෙල පිළිකා 95%කට වඩා HPV ආසාදනය මගින් සිදුවේ.
- ❖ ලිංගික ජීවිතය ඇරඹීමට පෙර HPV එන්නත ලබා ගැනීමෙන් මෙම ආසාදනයට ලක්වීම වලක්වා ගත එමගින් ගැබ්ගෙල පිළිකාව වලක්වා ගත හැක.
- ❖ දූතට මෙම එන්නත ශ්‍රී ලංකාවේදී ලබා ගත හැක්කේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා මගින් පමණි.
- ❖ අඩු වයසින් ලිංගික ජීවිතය ඇරඹූ කාන්තාවන්ට.
- ❖ බහු පුරුෂ සේවනයේ යෙදෙන කාන්තාවන්ට.
- ❖ බහු ස්ත්‍රී සේවනයේ යෙදෙන පුරුෂයන් සමග ලිංගිකව සම්බන්ධ වන කාන්තාවන්ට.
- ❖ අක්‍රියව හෝ සක්‍රියව දුම් පානයේ යෙදෙන කාන්තාවන්ට.
- ❖ විවිධ රෝග සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණය හීන කරවන බෙහෙත් ගන්නා කාන්තාවන්ට.
- ❖ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග සෑදී ඇති කාන්තාවන්ට.

ගැබ්ගෙල පිළිකාව පූර්ව පිළිකා අවධියේදී හඳුනා ගත හැකිද? ඔව්

අනෙකුත් පිළිකා වර්ග මෙන් නොව ගැබ්ගෙල පිළිකාව වලක්වා ගත හැක. ගැබ්ගෙලෙහි සිදුවන වෙනස්කම් මුල් අවස්ථාවේදී හඳුනාගැනීමෙන් හා ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් එම මූලික අවස්ථාවන් පිළිකාවක් බවට කල් යාමේ දී පත් වීමට ඇති හැකියාව වලකාලයි.

ඔබ ගැබ්ගෙල පිළිකාවක් සෑදීමේ අවදානමක සිටින බව කලින් දැන ගත හැකිද?

එය කළ හැකියි

පැප් පරික්ෂාවකින්

- ❖ පැප් පරික්ෂාවක් යනු; ගැබ්ගෙල ආශ්‍රයෙන් සිදු කරන සරල පරීක්ෂණයකි.
- ❖ මේ සඳහා ඔබ පැමිණිය යුතු වන්නේ මාසික ශුද්ධ වීම සිදු වී නොමැති දිනකදී ය.
- ❖ මෙමගින් ඔබට කිසිදු වේදනාවක් හෝ අපහසුතාවයක් ඇති නොවේ.
- ❖ මෙමගින් ගැබ්ගෙලෙහි පූර්ව පිළිකා සෛල හඳුනා ගත හැක.

පැප් පරීක්ෂණයට යොමු විය යුත්තේ කවුද?

- ❖ පැප් පරීක්ෂණය නිරෝගී කාන්තාවන් වෙනුවෙනි.
- ❖ ලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වන සියලු කාන්තාවන් සඳහා ප්‍රථම ලිංගික එක්වීමෙන් වසර 5කට පසු මෙය නිර්දේශ කෙරේ.
- ❖ මෙම පරීක්ෂණය අවුරුදු 35ට වැඩි කාන්තාවන්ට සුවනාරි සායන වලදී කර ගත හැක.

