

ඔබට මේ ලක්ෂණ තිබේද?

- ගැට්ටි සහ ඉදිමි
- අසාමාන්‍ය ලේ ගැලීම්
- පැහැදිලි කළ නොහැකි ඔර අඩුවීම්
- දිගු කාලීනව පවතින වේදනාව
- සති 2 හට වැඩි වැසිකිළි පුරුදුවල වෙනස්කම්
- දිගට පවතින කැස්ස, හටහළු සහ හුස්ම ගැනීමේ වෙනස්කම්
- උපත් ලපයක වෙනස්කම් / සමී ඇතිවන හට වෙනස්කම්
- බිංගී පියවුරු වල ඕනෑම වෙනස්කම්
- දිගු කාලීනව පවතින බඩ පිපීම

ඉහත ලක්ෂණ එකක් හෝ ඔබට ඇත්නම්, පිළිකා තලින් හඳුනා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණෙන්න

අපගේ කණ්ඩායම

- වෛද්‍ය නිලධාරීන්
 - දත්ත සහ වෛද්‍යවරයන්
 - මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සොයුරිය
 - හෙද නිලධාරීන්
 - විකිරණවේද මිලිපිත්
 - වෛද්‍ය රසායනඥා ආරක්ෂණ මිලිපි
 - සෞඛ්‍ය සේවා සහායකවරුන්
- (මෙම මධ්‍යස්ථානයේ වාර්තා සිටිමි විකිරණවේද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයන් සිටිත් සිදු කරනු ලබයි.)

පියවුරු පිළිකා

ලංකාවේත්, ලෝකයේත් බහුලතම පිළිකාවයි!

දිනකට හට රෝගීන් 15 ක්
 සතිපතට හට රෝගීන් 3 ක්

- පිරිමින්ගේ වැඩි මරණ අනුපාතයක් සහිත ආක්‍රමණශීලී පිළිකාවකි.
- මව්ගිරි දිනෙන් පිළිකා අවදානම අඩුවේ.

අවදානම් සාධක	බැලිය යුතු රෝග ලක්ෂණ
වයස්ගත වීම	පියවුරු ප්‍රමාණයේ වෙනස්කම්
පියවුරු පිළිකා පිළිබඳ පවුල් ඉතිහාසය	සමී රතු පැහැය
දුම්පානය සහ මත්පැන්	සමී වල ගැසීම
ආර්තවනර්ණයෙන් පසු තරබාරුකම්	පියවුරුවල හෝ සිහින්ලේ යට ගැටි
නොර්මෝන ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිකාර	පියවුරු මත පුව නොවන ආවේදනා
	තන පුඩුව ගිලීම/ තන පුඩුවෙන් ලේ හෝ දියර ගැලීම

- ඔබට ඉහත අවදානම් සාධක / රෝග ලක්ෂණ ආදියක් ප්‍රමාදයකින් තොරව පිළිකා සලකුණ හඳුනා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණෙන්න.

අප සපයන සේවාවන්

- ස්වයං පියවුරු පරීක්ෂාව පිළිබඳ අධ්‍යයන
- සායනික පියවුරු පරීක්ෂාවන්
- පියවුරු අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණ
- මැමෝග්‍රැෆි - සායනයේ වෛද්‍යවරයාගේ නිර්දේශය මත

ගැබ්ගෙල පිළිකා

- ගර්භාන්‍යයේ ගෙලකි ඇතිවන පිළිකාවකි.
- ගැබ්ගෙල පිළිකාවලින් 90% ක් මානව පැපිලෝමා වයිරසය (HPV) ආසාදනය වීම නිසා ඇතිවේ.



- ගැබ් ගෙල පිළිකා වැළැක්විය හැකි මෙන්ම, මුල් අවධියේදී හඳුනා ගතහොත් සුව කළ හැකි පිළිකාවකි.

HPV ආසාදනය හඳුනා ගැනීමට HPV-DNA පරීක්ෂණය සහ ගැබ්ගෙල පිළිකා හෝ පුර්ව පිළිකා තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමට PAP පරීක්ෂණය මෙහිදී සිදු කෙරේ.